

CISTO RESIDUAL: RELATO DE CASO CLÍNICO

Julia Belasco de SOUZA¹
Eni Vaz Franco Lima de CASTRO²
Alvimar Lima de CASTRO³
Henrique José Baldo de TOLEDO⁴
Cristiane Fumiko FURUSE⁵

RESUMO

O cisto residual é uma lesão cística que é originada de um cisto inflamatório periapical, persistente após a exodontia do dente envolvido. O diagnóstico se faz pela correlação entre os exames clínicos, radiográfico, e histopatológico. Clinicamente não apresenta nenhuma alteração, apenas quanto atinge tamanhos maiores em que pode se observar expansão em corticais ósseas. Radiograficamente se apresenta como uma imagem radiolúcida de tamanho variável circunscrita por uma linha radiopaca sem a presença do dente previamente envolvido. Tendo como diagnóstico diferencial, lesões como ameloblastoma, tumor odontogênico ceratocístico e cisto ósseo traumático. O seu tratamento é sempre pela remoção cirúrgica acompanhado dos exames histopatológico para a confirmação do diagnóstico. Paciente do sexo masculino, 59 anos de idade, apresentou-se ao serviço de Estomatologia, tendo sido encaminhado pelo cirurgião dentista para a avaliação de um aumento volumétrico na região do 35 e 36. Ao exame radiográfico nesta mesma região apresentou lesão radiolúcida unilocular com os limites bem definidos por uma fina linha radiopaca, sugerindo uma lesão expansiva possivelmente cística, foi decidido pela enucleação cirúrgica encaminhada para o Laboratório, com pós-operatório favorável.

Palavras-chave: Cisto residual. Lesão óssea. Cisto odontogênico.

¹ Graduanda do curso de Odontologia das Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul, SP – FUNEC, jubellasco@hotmail.com

² Docente das Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul, SP – FUNEC, enicastro14@gmail.com

³ Docente das Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul, SP – FUNEC, alvimar@foa.unesp.br

⁴ Docente das Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul, SP – FUNEC, henriquejbtoledo@ig.com.br

⁵ Docente do Centro Universitário de Adamantina, SP - (UniFAI), cfuruse@foa.unesp.br